







Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

| | | |
|--|--|---|
| <p>Niedriger Anteil Raucher</p> | <p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Niedriger Anteil an rauchenden Patienten</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p> | <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>33,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 580.596 Patienten</p> |
| <p>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</p> | <p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 40% der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p> | <p>Zielwert: ≤ 40%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>2,3%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 552.487 Patienten</p> |
| <p>Niedriger Anteil an Patienten mit Exazerbationen</p> | <p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 50% der Patienten hatten zwei oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p> | <p>Zielwert: ≤ 50%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>2,9%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 552.487 Patienten</p> |

Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

| | | |
|--|--|---|
| <p>Überprüfung der Inhalationstechnik</p> | <p>Qualitätsziel</p> <p>Bei mindestens 90% der Patienten wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p> | <p>Zielwert: ≥ 90%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>71,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 630.346 Patienten</p> |
| <p>Patienten mit systemischen Glukokortikosteroiden als Dauertherapie</p> | <p>Qualitätsziel</p> <p>Höchstens 10% der Patienten werden über zwei oder mehr aufeinanderfolgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide verordnet</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p> | <p>Zielwert: ≤ 10%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>3,9%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 512.604 Patienten</p> |
| <p>Überweisung zum Facharzt</p> | <p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 90% der Patienten werden bei Beginn der Dauertherapie mit systemischen Glukokortikosteroiden in der vorhergehenden Dokumentation zum Facharzt überwiesen</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit der Verordnung systemischer Glukokortikosteroide in der vorhergehenden Dokumentation und in der aktuellen Dokumentation</p> | <p>Zielwert: ≥ 90%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>25,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 2.020 Patienten</p> |

Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

