


DMP CHRONISCH OBSTRUKTIVE ATEMWEGSERKRANKUNG: AUSWERTUNG 2023

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) für das Jahr 2023 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten sowie die Erreichung der Qualitätsziele.

ALTERSSTRUKTUR


Im Jahr 2023 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten älter als 66 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten der Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



n = 223.848

ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP COPD eingeschriebenen Patientinnen und Patienten im Verlauf der Jahre von 2006 bis 2024 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2025.




*Ausnahmeregelungen für Schulungen und Dokumentationen aufgrund der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020

Stand: 01.01.2025

QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 16 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Niedriger Anteil Rauchende		
Niedriger Anteil rauchender Teilnehmenden	› alle Teilnehmenden › n = 623.220	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 31,7 %  31,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen		
Höchstens 10 % der Teilnehmenden hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten 12 Monate	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 528.905	› Zielwert: ≤ 10 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 3,0 %  3,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Niedriger Anteil an Teilnehmenden mit Exazerbationen		
Höchstens 20 % der Teilnehmenden hatten eine oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten 6 Monate	› alle Teilnehmenden mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 570.060	› Zielwert: ≤ 20 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 5,8 %  5,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Überprüfung der Inhalationstechnik		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft	› alle Teilnehmenden › n = 623.220	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 59,2 %  59,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Teilnehmenden mit systemischen Glukokortikosteroiden als Dauertherapie		
Höchstens 10 % der Teilnehmenden erhalten über zwei aufeinanderfolgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide	› alle Teilnehmenden › n = 605.351	› Zielwert: ≤ 10 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 1,3 %  1,3% 0%2%4%6%8%10%
Jährlicher FEV1-Wert		
Anteil von Teilnehmenden mit einem dokumentierten FEV1-Wert in den letzten 12 Monaten	› alle Teilnehmenden › n = 529.564	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 74,8 %  74,8% 0%20%40%60%80%100%
Rauchende erhalten eine Empfehlung zum Tabakverzicht		
Hoher Anteil von rauchenden Teilnehmenden erhalten eine Empfehlung zum Tabakverzicht	› alle rauchenden Teilnehmenden › n = 198.374	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 68,9 %  68,9% 0%20%40%60%80%100%
Trotz Empfehlung keine Teilnahme am Tabakentwöhnungsprogramm		
Niedriger Anteil aktuell rauchenden Teilnehmenden, die trotz Empfehlung nie am Tabakentwöhnungsprogramm teilgenommen haben	› alle rauchenden Teilnehmenden › n = 80.974	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 84,7 %  84,7% 0%20%40%60%80%100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Nicht indizierter Einsatz an ICS		
Niedriger Anteil an Teilnehmenden mit FEV1 $\geq$ 50 % ohne Komorbidität Asthma, die mit inhalativen Glukokortikosteroiden (ICS) behandelt werden	› alle Teilnehmenden › n = 73.460	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 43,1 %  0% 20% 40% 60% 80% 100%
Einschätzung des Osteoporose-Risikos		
Anteil von Teilnehmenden mit mindestens einer dokumentierten Osteoporose-Risikoeinschätzung in den letzten 12 Monaten	› alle Teilnehmenden › n = 529.564	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 48,0 %  0% 20% 40% 60% 80% 100%
Empfehlung wöchentliches körperliches Training		
Anteil von Teilnehmenden, die im Dokumentationszeitraum eine Empfehlung zu einem mindestens einmal wöchentlichen körperlichen Training erhalten haben	› alle Teilnehmenden › n = 623.220	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 52,5 %  0% 20% 40% 60% 80% 100%
Rauchende, bereits bei Einschreibung geraucht		
Anteil von aktuell rauchenden Teilnehmenden, die bereits bei Einschreibung geraucht haben	› alle rauchenden Teilnehmenden, die bereits bei Einschreibung geraucht haben › n = 238.655	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 64,6 %  0% 20% 40% 60% 80% 100%



Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp