


DMP DIABETES MELLITUS TYP 1: AUSWERTUNG 2023

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) für das Jahr 2023 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten sowie die Erreichung der Qualitätsziele.


ALTERSSTRUKTUR

Im Jahr 2023 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten älter als 41 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten der Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP DM1 eingeschriebenen Patientinnen und Patienten im Verlauf der Jahre 2007 bis 2024 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2025.






*Ausnahmeregelungen für Schulungen und Dokumentationen aufgrund der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020

Stand: 01.01.2025

QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 16 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Vermeidung schwerer Hypoglykämien		
Höchstens 15 % der Teilnehmenden hatten eine oder mehrere schwere Hypoglykämien innerhalb der letzten 12 Monate	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 243.065	› Zielwert: $\leq 15 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 1,6 % 
Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen		
Höchstens 2 % der Teilnehmenden hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten 6 Monate	› alle Teilnehmenden mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 244.747	› Zielwert: $\leq 2 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 0,6 % 
Untersuchung Injektionsstellen		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurden die Injektionsstellen in den letzten 6 Monaten untersucht	› alle Teilnehmenden mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 245.377	› Zielwert: $\geq 90 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 80,7 % 

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Erreichen von normotensiven Blutdruckwerten		
Mindestens 60 % der Teilnehmenden mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck von $\leq 139 / 89$ mmHg	› alle Teilnehmenden, bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde › n = 98.699	› Zielwert: ≥ 60 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 52,2 %  52,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Teilnehmende unter 30 Jahren mit einem HbA1c-Wert von $> 8,5$ % (69 mmol / mol)		
Höchstens 20 % der Teilnehmende unter 30 Jahren haben einen HbA1c-Wert von $> 8,5$ % (69 mmol / mol)	› alle Teilnehmenden, die jünger sind als 30 Jahre › n = 53.270	› Zielwert: ≤ 20 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 24,7 %  24,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Teilnehmende über 30 Jahre mit einem HbA1c-Wert von $> 8,5$ % (69 mmol / mol)		
Höchstens 10 % der Teilnehmenden über 30 Jahre haben einen HbA1c-Wert von $> 8,5$ % (69 mmol / mol)	› alle Teilnehmenden, die mindestens 30 Jahre alt sind › n = 210.446	› Zielwert: ≤ 10 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 15,3 %  15,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Erreichen des individuell vereinbarten HbA1c-Zielwertes		
Ein hoher Anteil der Teilnehmenden hat den individuell vereinbarten HbA1c-Zielwert erreicht	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 243.921	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 54,4 %  54,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bestimmung der Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden erfolgt jährlich die Ermittlung des Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin	› alle Teilnehmenden ab 11 Jahren mit einer DMP-Teilnahmedauer von mindestens 12 Monaten und ohne bereits manifeste diabetische Nephropathie › n = 208.493	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 70,7 %  70,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nierenfunktion (eGFR)		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurde die eGFR in den letzten 12 Monaten bestimmt	› alle Teilnehmenden ab 18 Jahre mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 219.514	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 79,9 %  79,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer	› alle Teilnehmenden ab 18 Jahre mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 19.345	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 60,2 %  60,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Erhebung des Fußstatus		
Bei mindestens 80 % der Teilnehmenden wurde der Fußstatus in den letzten 12 Monaten erhoben	› alle Teilnehmenden ab 18 Jahre › n = 218.633	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 80,6 %  80,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%



Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp